

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ WYŁOTKĘ, ŻEBY NIEMA JĄ BYŁO PRZECZYTAĆ
Bausch+Lomb Wielefunkcyjny Puzdro na soczewki Biotrue®

Do pielęgnacji, oczyszczania, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania i przechowywania. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji, oczyszczania, dezynfekcji i usuwania osadów białkowych w trzech prostych krokach. Zalecany przez Bausch + Lomb schemat codziennej pielęgnacji dla zachowania zdrowia oczu i komfortu noszenia soczewek kontaktowych:

KROK 1: Na jeden wieczór po założeniu należy umieścić 3 krople płynów wielofunkcyjnego Biotrue® i dokładnie pocierać przez 20 sekund.

KROK 2: Należy nanieść przez 5 sekund dokładnie płyn albo stropy soczewki płynem wielofunkcyjnym Biotrue®.

KROK 3: Oczyszczony soczewki należy umieścić w pojemniku i napełnić pojemnik świeżą porcją płynu wielofunkcyjnego Biotrue®. Soczewki powinny być zanurzone w płynie przez co najmniej 4 godziny. Zwrócić uwagę, aby woda nie dostała się do oczu. Teraz można złożyć soczewki. Jeśli pozostały jeszcze na nich jakiegokolwiek zanieczyszczenia, przed umieszczeniem na gałce ocznej należy je wyplukać płynem wielofunkcyjnym Biotrue®. Zawsze należy przestrzegać wskazań specjalisty. Specjalista może zalecić stosowanie dodatkowych produktów lub procedur w zależności od indywidualnych parametrów biochemicznych oka i trybu noszenia soczewek. Należy pamiętać, że soczewki przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku. Ich przechowywanie soczewek nie gwarantuje zwolnienia z obowiązku noszenia soczewek zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy, należy udać się do specjalisty. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia powonanych zmian, takich jak zakażenie, owrzodzenie rogówki, neowaskularyzacja czy zapalenie tęczówki. Aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu narządu wzroku, należy niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą, który przeprowadzi odpowiednią diagnostykę i zaleci właściwe działanie.

Skład: hyaluronian, sulfobetain, poloksamina, kwas borowy, boran, sodu, ssł dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, chlorok sodu konserwowany 0.00013% roztworem biguanidu polyminiopropylu o mocy 0.0001% polychromianu.

Sposób działania: Stosowany codziennie płyn wielofunkcyjny Biotrue® rozpuszcza osady białkowe, oczyszcza, odrywa od powierzchni miękkich soczewek kontaktowych i usuwa nagromadzone na nich resztki filmu łzowego, zanieczyszczenia oraz złogi. Płyn wielofunkcyjny Biotrue® zapobiega powstawaniu na powierzchni soczewek depozytów podrażniających oczy. Zabija także drobnoustroje chorobotwórcze. Gdy soczewki przechowywane są w płynie, jego składniki tworzą na powierzchni soczewek warstwę ochronną, która pomaga utrzymać komfort noszenia przez cały dzień. Płyn wielofunkcyjny Biotrue® może być również używany do płukania soczewek.

Zalety płynu Biotrue®: Inspirowany biologią narządu wzroku™ płyn wielofunkcyjny Biotrue® zawiera substancje zwijające będącą również składnikiem filmu łzowego, a jego odczyn jest dopasowany do pH zdrowych łez. Wielefunkcyjny płyn do soczewek Biotrue® zabezpiecza i zwilża soczewki kontaktowe, przedłużając komfort ich noszenia. Płyn wielofunkcyjny Biotrue® zapobiega demineralizacji powłok i łuski, która pomaga utrzymać komfort noszenia przez cały dzień. Płyn wielofunkcyjny Biotrue® może być również używany do płukania soczewek.

Wskazania do stosowania: Wielefunkcyjny płyn do soczewek Biotrue® jest wskazywany do codziennej pielęgnacji, oczyszczania, usuwania osadów białkowych, płukania, chemie (nie termicznej) dezynfekcji oraz przechowywania miękkich (hydrofiliowych) soczewek kontaktowych (w tym także soczewek szklano-hydrofiliowych) zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przedwskazania: Uczenie na trykociowej ze składników preparatu.

UWAGA: PROBLEMY ZWIĄZANE Z UŻYTIWNIENIEM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH I PRODUKTÓW DO ICH PIELIEGNACI MOGĄ PRZYPISZYĆ SIĘ DO ROZWOJU ZAKAŻENIA (LUB) OWRZODZENIA ROGÓWKI, A NAWET OPÓŹNIENIE DO UTRATY WZROKU. Istotne jest dokładne przestrzeganie wszystkich podanych na etykiecie instrukcji dotyczących właściwego użytkowania i produktów przeznaczonych do pielęgnacji soczewek kontaktowych. Zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

Stwierdzono również, że częstotliwość występowania zdarzeń niepożądanych zwiększa się u osób palących papierosy. W przypadku noszenia soczewek kontaktowych, zmiana odczynu wzroku, w tym owrzodzenie rogówki, mogą wynikać ze syżko i doprowadzić do utraty wzroku. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym nie powinny być używane przez całą noc i należy je zdjąć przed snem. W badaniach klinicznych wykazano, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest zwiększone w przypadku noszenia tego typu soczewek w nocy. Soczewki kontaktowe przeznaczone do przedłużonego noszenia powinny być w regularnych odstępach zdejmowane, czyszczone i przechowywane lub zastępowane maksymalnie raz na dobę zgodnie z zaleceniami specjalisty. W badaniach klinicznych wykazano, że użycie soczewek kontaktowych do przedłużonego noszenia wiąże się z zwiększeniem częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z nośnieniem soczewek w trybie dziennym. W badaniach wykazano także, że ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych jest tym większe, im dłużej takie soczewki były noszone bez zdejmowania.

- Przechowywanie w temperaturze pokojowej.
- Płyn należy użyć przed upływem terminu ważności podanego na butelce i kartonowym opakowaniu.
- Nieużyty płyn należy wyrzucić po upływie 90 dni od daty otwarcia opakowania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane (potencjalne problemy oraz jak należy postąpić w przypadku ich stwierdzenia): mogą wystąpić następujące objawy: swędzenie, pieczenie lub swędzenie oczu (podrażnienie), uczucie dyskomfortu po włożeniu soczewki, irytacja, obrzęk oka (obrzęk oka), zaczerwienienie oka, uszkodzenie nabłonka, nadmierne łzawienie, obecność nierównej wydziłiny w oku, zaczerwienienie oka, osłabienie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, irytacja, uczucie swędzenia lub „halo” (płaskienia) wokół źródeła światła, nadwrażliwość na światło (światłowstręt), uczucie suchości oczu. W przypadku zauważenia któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów należy:

- **Niezwolnienie wyjąć soczewki z oczu.**
- Jeśli dyskomfort lub podrażnienie ustąpią, należy dokonać obejrzenia soczewki.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia soczewki nie wolno jej ponownie zakładać. Należy umieścić ją w pojemniku do przechowywania i skontaktować się ze specjalistą.
- Jeśli na powierzchni soczewki widoczne są zanieczyszczenia, rzęsy czy jakiegokolwiek inne ciała obce albo stwierdzony problem ustąpi a soczewka będzie wyglądać na nieuszkodzoną, należy ją dokładnie oczyścić, wypłukać i zdezyfekować. Następnie można ponownie włożyć soczewkę.
- Jeśli problem nadal występuje, należy natychmiast odstawić ją z oka i zwrócić się do specjalisty. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z wymienionych wyżej objawów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia powonanych zmian, takich jak zakażenie, owrzodzenie rogówki, neowaskularyzacja czy zapalenie tęczówki. Aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu narządu wzroku, należy niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą, który przeprowadzi odpowiednią diagnostykę i zaleci właściwe działanie.

Zasady higieny obowiązujące podczas pielęgnacji soczewek kontaktowych:

- Zawsze przed kontaktem z soczewkami należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.
- Za każdym razem po zdjęciu soczewek należy je oczyścić, wypłukać i zdezyfekować płynem do pielęgnacji soczewek.
- Zawsze należy jako pierwszą wyjmować tę samą soczewkę – lewą lub prawą – aby uniknąć ich pomylenia.
- Za każdym razem po wyjęciu soczewek pojemnik należy opróżnić, oczyścić i wypłukać świeżą porcją płynu wielofunkcyjnego Biotrue®, a następnie pozostawić do wyschnięcia.

Dostępne w ofercie rozmiar opakowań: wielofunkcyjny płyn do soczewek Biotrue® dostępny jest w sterylnych plastikowych butelkach o pojemności 60 ml, 120 ml, 300 ml oraz 360 ml. Na butelkach i zewnętrznych opakowaniach kartonowych podano numer serii oraz datę ważności.

TENTO LETA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE. STAROSTLIV SI HO PREČÍTAJTE A ODLOŽTE PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI.

Bausch+Lomb Biotrue® multi-purpose solution

Udržuje šošovky, čistí, odstraňuje proteíny, dezinfikuje, oplachuje, uchováva
Návod na použitie: Pri dennom čistení, dezinfekcii a odstraňovaní proteínov postupujte podľa týchto jednoduchých krokov. Spoločnosť BAUSCH + LOMB doporučuje tento režim pre zdravé a pohodlné nosenie kontaktných šošoviek.
KROK 1: Na každú stranu počiť šošovky kvapnite aspoň 3 kvapky viacúčelového roztoku Biotrue® a jemne tričte povrch po dobu 20 sekúnd.

KROK 2: Každú stranu šošovky dôkladne opláchnite po dobu 5 sekúnd viacúčelovým roztokom Biotrue®.
KROK 3: Vyčistené kontaktné šošovky vložte do puzdra na šošovky a puzdro naplňte čerstvým viacúčelovým roztokom Biotrue®. Rôztek nechajte pôsobiť najmenej 4 hodiny. Pamätajte: Vy používate čerstvý roztok – nikdy nepoužívajte už použitý roztok.

Všetchny informace o používání kontaktních šošoviek, Rôztek tiež zabráňuje usadeniu dráždivých látok na povrchu šošoviek, a tým znižuje riziko podráždenia. Ak na nich ostane akákoľvek nečistota, pred vloženie na oko ich opláchnite viacúčelovým roztokom Biotrue®. Vždy dodržujte pokyny svojho očnému špecialistu. Podľa individuálneho chemického zloženia vašich šošoviek a rozsahu nosenia kontaktných šošoviek vám váš očný špecialista môže doporučiť ďalšie výrobky alebo postupy. Pokiaľ kontaktné šošovky nenosíte, uložte ich do uzavretého puzdra. Nikdy nenahrádzajte viacúčelový roztok Biotrue® fyziologickým roztokom, ktorý nedezinfikuje! Šošovky môžu byť uložené v zatvorenom puzdre na šošovky a pripravené na použitie maximálne raz na dobú. V prípade, že sa uloženie v puzdre dlhšie ako pred ich nasadením na oko ich musíte ošetriť a dezinfikovať čerstvým viacúčelovým roztokom Biotrue®.
Zloženie: Sterilný, izotonický roztok obsahujúci hyaluronan, sulfobetain, poloksamín, kyselinu boricu, boritan sodný, edetát disodný, chlorid sodný a duálny dezinfekčný systém (polyminiopropyl biguanid 0.00013% a polykvetanum 0.0001%).

Účinky: Pri dennom používaní Biotrue® viacúčelový roztok rozkladá proteíny, čistí, uvoľňuje a odstraňuje nánosy a usadeniny z mäkkých kontaktných šošoviek. Rôztek tiež zabráňuje usadeniu dráždivých látok na povrchu šošoviek a tým znižuje riziko podráždenia. Zloženie roztoku zabezpečuje celodennú lubrikáciu kontaktných šošoviek pre pohodlné nosenie. Je tiež vhodný na oplachovanie šošoviek.

Výhody viacúčelového roztoku Biotrue®: Inšpirovaný fyziológiou vašich očí™, viacúčelový roztok Biotrue® obsahuje aj lubrikant, ktorý sa nachádza aj vo vašich očiach a jeho pH je vytvorené na úrovni zdravých šŕ. Biotrue® viacúčelový roztok obsahuje kontaktné šošovky zvlhčujúcu vrstvu (podráždenie), nie je vysušujúca, zabíja baktérie, demineralizuje a chráni pred poškodením proteínov v ŕžkách a spomaľuje proces formovania usadenín, čím sa znižuje nepohodlie a následného skrátenia času nosenia kontaktných šošoviek. Celodenné zvlhčenie a čistota šošoviek sú zárukou celodenného pohodlného nosenia. Biotrue® je roztok, ktorý vytvára prirodzené prostredie pre vaše oči.
Indikácia: Biotrue® viacúčelový roztok je určený k dennému čisteniu, odstraňovaniu proteínov, oplachovaniu, k chemickému (nie tepelnému) dezinfekcii a uchovávaniu všetkých mäkkých hydrofiličných a kontaktných šošoviek. Biotrue® viacúčelový roztok možno použiť na čistenie a oplachovanie šošoviek z oka a ihneď navštíviť svojho očnému špecialistu. Použitvateľom kontaktných šošoviek sa doporučuje návšteva očnému špecialistu dvakrát ročne, ak je potrebné, tak aj častejšie. Doporučuje sa dodržiavať uvedení dobu potierania a oplachovania doporučením výrobcu v tomto texte, aby bola zabezpečená dezinfekcia a znížila sa riziko kontaminácie. Skrátenie času trenia a oplachovania

VAROVANIE: PROBLÉMY S KONTAKTNÝMI ŠOŠOVKAMI A PRÍPRAVKAMI NA ICH OŠETROVANIE MOŽU SPÔSOBIŤ INFÉKČNÉ / ALEBO ULCEROZNE OCHORENIE ROHOVY, ČO MOŽE SPÔSOBIŤ AŽ STRATU ZRAKU. Je preto nevyhnutné dodržiavať pokyny vášho očnému špecialistu a pokyny výrobu u uvedené pre korektné používanie kontaktných šošoviek a prípravkov na ich ošetrovanie, vrátane pravidelného čistenia, oplachovania, dezinfekcie a uchovávanie šošoviek. Šlohen roztoku môže byť použitý na čistenie a oplachovanie šošoviek z oka a ihneď navštíviť svojho očnému špecialistu. Použitvateľom kontaktných šošoviek sa doporučuje návšteva očnému špecialistu dvakrát ročne, ak je potrebné, tak aj častejšie. Doporučuje sa dodržiavať uvedení dobu potierania a oplachovania doporučením výrobcu v tomto texte, aby bola zabezpečená dezinfekcia a znížila sa riziko kontaminácie. Skrátenie času trenia a oplachovania

VAROVANIE: PROBLÉMY S KONTAKTNÝMI ŠOŠOVKAMI A PRÍPRAVKAMI NA ICH OŠETROVANIE MOŽU SPÔSOBIŤ INFÉKČNÉ / ALEBO ULCEROZNE OCHORENIE ROHOVY, ČO MOŽE SPÔSOBIŤ AŽ STRATU ZRAKU. Je preto nevyhnutné dodržiavať pokyny vášho očnému špecialistu a pokyny výrobu u uvedené pre korektné používanie kontaktných šošoviek a prípravkov na ich ošetrovanie, vrátane pravidelného čistenia, oplachovania, dezinfekcie a uchovávanie šošoviek. Šlohen roztoku môže byť použitý na čistenie a oplachovanie šošoviek z oka a ihneď navštíviť svojho očnému špecialistu. Použitvateľom kontaktných šošoviek sa doporučuje návšteva očnému špecialistu dvakrát ročne, ak je potrebné, tak aj častejšie. Doporučuje sa dodržiavať uvedení dobu potierania a oplachovania doporučením výrobcu v tomto texte, aby bola zabezpečená dezinfekcia a znížila sa riziko kontaminácie. Skrátenie času trenia a oplachovania

VAROVANIE: PROBLÉMY S KONTAKTNÝMI ŠOŠOVKAMI A PRÍPRAVKAMI NA ICH OŠETROVANIE MOŽU SPÔSOBIŤ INFÉKČNÉ / ALEBO ULCEROZNE OCHORENIE ROHOVY, ČO MOŽE SPÔSOBIŤ AŽ STRATU ZRAKU. Je preto nevyhnutné dodržiavať pokyny vášho očnému špecialistu a pokyny výrobu u uvedené pre korektné používanie kontaktných šošoviek a prípravkov na ich ošetrovanie, vrátane pravidelného čistenia, oplachovania, dezinfekcie a uchovávanie šošoviek. Šlohen roztoku môže byť použitý na čistenie a oplachovanie šošoviek z oka a ihneď navštíviť svojho očnému špecialistu. Použitvateľom kontaktných šošoviek sa doporučuje návšteva očnému špecialistu dvakrát ročne, ak je potrebné, tak aj častejšie. Doporučuje sa dod